

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению лекарственного препарата для медицинского применения

### Стрепсилс® с Согревающим Эффектом

**Регистрационный номер:** ЛП-001623

**Торговое наименование:** Стрепсилс® с Согревающим Эффектом

**МНН или группировочное наименование:** амилметакрезол+дихлорбензиловый спирт

**Лекарственная форма:** таблетки для рассасывания

#### Состав

Одна таблетка для рассасывания содержит *действующие вещества*: 2,4-дихлорбензиловый спирт 1,2 мг, амилметакрезол 0,6 мг;  
*вспомогательные вещества*: винная кислота 26 мг, краситель антоцианин (E163) 3,46 мг, ароматизатор сливовый 9,1 мг, ароматизатор сливочный 4,37 мг, ароматизатор с эффектом согревания 0,52 мг, ароматизатор имбирный 2,08 мг, триглицериды среднецепочные 0,79 мг, сахарный сироп [сахароза, вода] 1384 мг и декстроза жидкая [декстроза, олиго- и полисахариды] (жидкая глюкоза) 1102 мг до получения таблетки массой 2,6 г.

#### Описание

Круглые таблетки от красного до фиолетового цвета с гравировкой буквы S с 2-х сторон таблетки. Допускается белый налет, неравномерность окрашивания, наличие пузырьков воздуха в карамельной массе и незначительная неровность краев.

**Фармакотерапевтическая группа:** антисептическое средство.

**Код АТХ:** R02AA03

#### Фармакологические свойства

Препарат оказывает антисептическое действие, активен в отношении широкого спектра грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов *in vitro*, оказывает антимикотическое действие.

#### Показания к применению

Симптоматическое лечение боли в горле при инфекционно-воспалительных заболеваниях.

## **Противопоказания**

- повышенная чувствительность к компонентам препарата;
- детский возраст до 6 лет;
- дефицит сахаразы/изомальтазы, непереносимость фруктозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.

## **С осторожностью**

Беременность, период грудного вскармливания, сахарный диабет.

## **Применение при беременности и в период грудного вскармливания**

Применение препарата во время беременности и в период грудного вскармливания возможно только по рекомендации врача в случае, если предполагаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода и ребенка.

## **Способ применения и дозы**

Внимательно прочтите инструкцию перед приемом препарата.

Местно. Взрослым и детям старше 6 лет: рассасывать по одной таблетке каждые 2-3 часа.

Взрослым и детям старше 12 лет не принимать более 12 таблеток в течение 24 часов.

Детям от 6 до 12 лет не принимать более 8 таблеток в течение 24 часов. Не превышайте указанную дозу.

Продолжительность курса лечения – не более 3 дней. Если при приеме препарата в течение 3 дней симптомы сохраняются, необходимо прекратить лечение и обратиться к врачу.

## **Побочное действие**

Нижеперечисленные побочные реакции отмечались при кратковременном приеме препарата в рекомендованных дозах. При лечении хронических состояний и при длительном применении возможно появление других побочных реакций.

Оценка частоты возникновения побочных реакций произведена на основании следующих критериев: очень часто ( $\geq 1/10$ ), часто (от  $\geq 1/100$  до  $< 1/10$ ), нечасто (от  $\geq 1/1000$  до  $< 1/100$ ), редко (от  $\geq 1/10\ 000$  до  $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10\ 000$ ), частота неизвестна (данных для оценки частоты недостаточно).

### Нарушения со стороны иммунной системы

Частота неизвестна: реакции гиперчувствительности.

### Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта

Частота неизвестна: тошнота, боль в животе, ощущение дискомфорта в полости рта (чувство жжения или покалывания, отек).

### Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей

Частота неизвестна: сыпь.

При появлении вышеуказанных или иных побочных реакций, не указанных в инструкции, следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

### **Передозировка**

Маловероятна, возможная передозировка может привести к дискомфорту со стороны желудочно-кишечного тракта: тошноте.

*Лечение:* симптоматическое под контролем врача.

### **Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Клинически значимых взаимодействий с другими препаратами не выявлено.

Возможно одновременное применение препарата с другими местными противомикробными средствами.

### **Особые указания**

Рекомендуется принимать препарат максимально возможным коротким курсом и в минимальной эффективной дозе, необходимой для устранения симптомов.

Больные сахарным диабетом должны учитывать, что каждая таблетка содержит около 2,6 г сахара (0,22 ХЕ).

При сохранении симптомов или при появлении повышения температуры тела или головной боли, следует обратиться к врачу.

### **Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами**

Препарат не оказывает влияния на способность управлять автотранспортом и механизмами, а также на занятия другими потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций.

### **Форма выпуска**

Таблетки для рассасывания.

По 2, 4, 6, 8, 10 или 12 таблеток в блистере (ПВХ/ПВДХ/алюминий). По 1, 2, 3, 4 или 5 блистеров помещают в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

**Условия хранения**

Хранить при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не использовать после истечения срока годности.

**Условия отпуска**

Без рецепта.

**Юридическое лицо, на имя которого выдано регистрационное удостоверение, и производитель**

Рекитт Бенкизер Хелскэр Интернешнл Лтд, Тейн Роуд, Ноттингем, NG90 2DB, Великобритания.

**Представитель в России/Организация, принимающая претензии потребителей**

ООО «Рекитт Бенкизер Хэлскэр»

Россия, 115114, г. Москва, Шлюзовая наб., д. 4

Тел.: 8-800-200-82-20 (только для России, звонок бесплатный)

contact\_ru@rb.com